



Immunofort płyn 125g - Leki Natury

Nasza cena	19,75 zł
Produkt	Produkt niedostępny
Czas wysyłki	24h
Numer katalogowy	5909990159918
Kod EAN	5909990159918
Producent	Leki Natury

Opis produktu

IMMUNOFORT

płyn doustny

Wskazania do stosowania

IMMUNOFORT jest stosowany pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych, gardła, migdałków, jamy ustnej i zatok w skłonnościach do częstych przeziębień zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych źle gojących się ranach.

Immunofort jest lekiem roślinnym, tradycyjnym i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Skład

100g leku zawiera:

- Sok z ziela jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae herbae recentis succus) - 40,0g,
- Sok z owoców aronii (Aroniae fructi succus) - 30,0g,
- Sok z ziela pokrzywy (Urticae herbae recentis succus) - 10,0g,
- Sok z korzenia łopianu (Bardanae radices recentis succus) - 10,0g,
- Ekstrakt z kwiatów rumianku (Chamomilae extractum fluidum) - 10,0g.

Lek zawiera w dawce jednorazowej 1,0 mg kwasów polifenolowych w przeliczeniu na kwas kawowy.

Rodzaj i zawartość opakowania - Butelka, 125g.

Jak stosować lek IMMUNOFORT?

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 3-5 ml leku do 4 razy dziennie, 30 min. przed jedzeniem, rozpuszczając lek w małej ilości wody. Rozpocząć terapię preparatem przy pierwszych objawach infekcji, kontynuując leczenie nie dłużej niż 10 dni.

Zanim zastosuje się lek IMMUNOFORT

Nie należy stosować leku w przypadku reakcji nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych lub na rośliny z rodziny Złożonych (Compositae). Nie stosować w przypadku:

- postępujących chorób układowych (np. gruźlica, sarkoidoza, kolagenozy, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych chorobach autoimmunologicznych i z autoagresji
- w onkologii u pacjentów leczonych cytostatykami
- u pacjentów po przeszczepach narządów
- w chorobach krwi, dotyczących układu białych krwinek (agranulocytoza, białaczka).
- w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma).

W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, uporczywego kaszlu lub innych niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

IMMUNOFORT zawiera alkohol etylowy (28-36% v/v). Dawka 3ml zawiera około 0,79-1,06% v/v etanolu, dawka 5ml zawiera około 1,32-1,78% v/v etanolu, co odpowiada średnio 6,5-8,8ml, 11-14,8ml wina lub 39,5-53ml, 66-89ml piwa. Preparat może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety ciężarne, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grup wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby czy cierpiący na padaczkę.

Stosowanie leku IMMUNOFORT u dzieci:

Leku IMMUNOFORT nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na zawartość etanolu - 28-36% (v/v)

Ciąża i karmienie piersią:

Nie zaleca się stosowania leku IMMUNOFORT podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na zawartość etanolu stosowanie produktu może wywierać wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, z tego względu nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Stosowanie innych leków:

Nie stosować z lekami immunosupresyjnymi (np. cyklosporyna, metotreksat, glikokortykosteroidy). Może nastąpić potęgowanie działania przeciwzapalnego małych dawek kwasu acetylosalicylowego. W badaniach in vitro wykazano indukcję aktywności enzymu CYP3A4 przez składniki aktywne z ziela jeżówki purpurowej, czym tłumaczy się obserwowane zwiększenie klirensu osoczowego midazolamu, natomiast hamowanie aktywności enzymu CYP1A2 może prowadzić do zmniejszenia klirensu kofeiny i tolbutamidu i w znaczący sposób obniżenia klirensu midazolamu. Produkty lecznicze zawierające koszyczek rumianku mogą potencjalnie nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny. Preparaty z korzeniem łopianu mogą wpływać na terapię lekami przeciw cukrzycowymi. Ze względu na obecność w produkcie leczniczym soku z ziela pokrzywy oraz korzenia łopianu może dojść do nasilenia działania leków moczopędnych.

W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana

Przy znacznym przedawkowaniu leku mogą wystąpić objawy typowe dla zatrucia alkoholowego biegunka, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku pominięcia dawki leku IMMUNOFORT:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek IMMUNOFORT może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na jeżówkę, charakteryzujące się wysypką, pokrzywką, skurczem oskrzeli, astmą i reakcją anafilaktyczną. Jeżówka może wywołać reakcje alergiczne u osób z atopią. Stwierdzono także związek z chorobami autoimmunologicznymi. W wyniku długiego stosowania

(powyżej 8. tygodni) może wystąpić leukopenia. W przypadku wystąpienia tych lub innych objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie leku IMMUNOFORT:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Dopuszczalne lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania.