




## Kora Kruszyny 50g - Kawon

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Nasza cena       | <b>4,75 zł</b>          |
| Produkt          | <b>Produkt dostępny</b> |
| Stan magazynowy  | <b>3 szt.</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>24h</b>              |
| Numer katalogowy | <b>5909994333536</b>    |
| Kod EAN          | <b>5909994333536</b>    |
| Producent        | <b>Kawon</b>            |

### Opis produktu

#### Kruszyna pospolita kora - Kawon

**Kruszyna pospolita** nazywana również wilcząną lub troszczyną. Surowcem zielarskim w jej przypadku jest kora, zawierająca garbniki, awonoidy, saponiny, alkaloidy peptydowe oraz sole mineralne, a także antrazwiązki, które wskazywane są jako jej najcenniejsze składniki. Co ciekawe, nie każda kora nadaje się do jej wykorzystania w leczeniu, dlatego też jest ona dokładnie sprawdzana pod kątem zawartości antrazwiązków.

**Kora kruszyny** wykorzystywana jest w przypadku przewlekłych zaparć, jako środek pobudzający perystaltykę jelit. Bywa także stosowana w chorobach pęcherzyka żółciowego i wątroby. Jej główne działanie, przeczyszczające, ma miejsce, ponieważ antrazwiązki po pierwsze blokują przepływ wody do krwiobiegu, w efekcie czego kał zostaje upłynniony, a po drugie wzmagają naprzemienne ruchy perystaltyczne jelit, dzięki czemu kał szybciej się przemieszcza i jest łatwiej wydalany.

Kora kruszyny (Frangulae cortex) Zakładu Zielarskiego Kawon to wyselekcjonowana z niezwykłą dokładnością kora, która zawiera odpowiednie ilości antrazwiązków. Środek do stosowania u osób dorosłych, które nie chorują na choroby jelit lub ich niedrożność czy zwężenie, na zapalenie wyrostka robaczkowego lub zapalenia okrężnicy. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, dla kobiet w ciąży lub karmiących bądź osób na niego uczulonych.

Kora kruszyny nie powinna być większa niż 0,4 g/ dobę. Do opakowania dołączono miarkę w celu ułatwienia dozowania.

Kora kruszyny Kawon dostępna jest w opakowaniach po 50 g.

**Wskazania do stosowania:** W zaparciach jako środek przeczyszczający.

**Skład:** 100g produktu zawiera 100g kory kruszyny (Frangulae cortex). Dawka jednorazowa kory kruszyny 0,4g (co odpowiada 2,5 ml wg podziałki na załączonej miarce) zawiera 28,5 ml związków antranooidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

**Przeciwwskazania:** Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, ostre choroby zapalne jelit (np. choroba Crohna), zapalenie wyrostka robaczkowego, wrzodziejące zapalenia okrężnicy, bóle brzucha o nieznanej etiologii, dzieci poniżej 12 roku życia, stany odwodnienia z utratą elektrolitów, uczulenie na korę kruszyny.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Bez konsultacji z lekarzem nie stosować przez dłuższy czas (nie dłużej niż 7 do 14 dni). Dłuższe przyjmowanie stymulujących środków przeczyszczających (dłużej niż 1 – 2 tygodnie) może prowadzić do przyzwyczajenia, konieczności zwiększenia dawki, atonii jelit i nasilenia zaparć. Korę kruszyny powinno się stosować dopiero, gdy zmiana pożywienia lub preparaty ze środkami pęczniającymi nie dają efektu terapeutycznego. Nie stosować kory kruszyny w przypadku wystąpienia takich objawów jak: silne bóle brzucha, wymioty i wzdęcia, ponieważ mogą one świadczyć o niedrożności jelit.

**Interakcje:** Przy stosowaniu przewlekłym (nadużywaniu) niedobór potasu może spowodować wzmożenie działania glikozydów nasercowych oraz wpłynąć na działanie środków przeciwartymicznych. Straty potasu mogą zwiększyć się przy jednoczesnym stosowaniu cięższych środków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy i korzenia lukrecji.

**Działania niepożądane:** Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości na korę kruszyny. Ponadto zaobserwowano bóle skurczowe w obrębie jamy brzusznej oraz biegunkę. Wystąpienie takich objawów świadczy o zastosowaniu zbyt wysokiej dawki. Podczas stosowania kory kruszyny może wystąpić zmiana koloru moczu, co nie ma znaczenia klinicznego.

Przy stosowaniu przewlekłym lub nadużywaniu mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno elektrolitowej, szczególnie utrata potasu, która powoduje zaburzenia czynności serca i osłabienie mięśni zwłaszcza przy jednoczesnym przyjmowaniu glikozydów sercowych, środków moczopędnych i steroidów kory nadnerczy. Ponadto przy przewlekłym stosowaniu może wystąpić białkomocz, krwimocz oraz odkładanie barwnika w błonie śluzowej jelita grubego (pseudomelanosis coli), które najczęściej zanika po odstawieniu leku. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

**Przedawkowanie:** Po zastosowaniu dawek wyższych niż zalecane może wystąpić silny ból brzucha i biegunka, która prowadzi do utraty elektrolitów, szczególnie potasu. W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

**Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:** Nie stosować w okresie ciąży i karmienia.

**Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn:** Nie stwierdzono

**Sposób stosowania i droga podania:** Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Odmierzyć 2,5 ml (0,4 g) kory zalać szklanką (200 ml) letniej wody. Ogrzewać do wrzenia, gotować powoli pod przykryciem przez 15 minut. Odstawić na 10 minut i przecedzić. Wypić jednorazowo przed snem. Nie zaleca się stosowania częściej niż 23 razy w tygodniu i przez okres dłuższy niż 12 tygodnie. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki niż szklanka odwaru przygotowanego z 0,4 g kory kruszyny. U niektórych pacjentów korzystne może być zastosowanie niższej dawki, która spowoduje uzyskanie efektu miękkiego stolca.