

Link do produktu: <https://www.zielar.ski/sol-bochenska-lecznicza-1kg-salco-p-2175.html>

Sól bocheńska Lecznicza 1kg - SALCO

Nasza cena	21,95 zł
Produkt	Produkt niedostępny
Czas wysyłki	24h
Numer katalogowy	5909990331918
Kod EAN	5909990331918
Producent	SALCO

Opis produktu

Skład:

Sól w przeliczeniu na suchą masę zawiera:

Kationów:

- sodowego Na+: nie mniej niż 35%
- potasowego K+: nie mniej niż 0,16%
- wapniowego Ca2+: nie mniej niż 1.6%
- magnezowego Mg2+: nie więcej niż 0.9%

Anionów:

- chlorkowego Cl-: nie mniej niż 55%
- jodkowego J-: nie mniej niż 0,03%
- bromkowego Br-: nie mniej niż 0,05%

Wskazania do stosowania:

Kąpiele:

- w schorzeniach reumatycznych
- reumatoidalne zapalenie stawów
- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
- choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów
- zapalenia reumatyczne mięśni i ścięgien
- zapalenia korzonków nerwowych
- schorzenia pourazowe narządu ruchu
- rekonwalescencja

W chorobach przemiany materii:

- dnawe zapalenie stawów
- profilaktyka niedoczynności tarczycy

W ginekologii:

- przewlekłe zapalenia przydatków

W dermatologii jako środek pomocniczy:

- łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe

W chorobach układu naczyniowego:

- zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn.

Stosowanie:

Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa może być używana, w postaci roztworu wodnego do kąpieli i inhalacji.

Przygotowanie roztworu do kąpieli: Do kąpieli zaleca się stosowanie 1-3%, wyjątkowo do 6% (choroby skóry) roztworu

wodnego Bocheńskiej Leczniczej Soli Jodowo-Bromowej. Oznacza to, że przeciętnie na wannę wody (ok. 100 l) należy wsypać 1-3 kg.

Kurację powinno się rozpocząć od stosowania niższego stężenia a następnie stopniowo zwiększać stężenie soli jodowo-bromowej w kąpielach.

Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieli nie powinno przekroczyć 1,5% (1,5 opakowania na 100 l wody). Optymalna temperatura kąpieli wynosi 35-36°C.

Przygotowanie roztworu do inhalacji: Dla przygotowania roztworu o odpowiednim stężeniu rozpuszcza się 1-2 łyżek stołowych soli jodowo-bromowej w l szklance wody o temp. 37°C. Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora.

Częstość stosowania inhalacji wg wskazań lekarza.