

Link do produktu: <https://www.zielar.ski/xenna-fix-20sasz-us-pharmacia-p-4585.html>

Xenna Fix 20sasz - US Pharmacia



Nasza cena	10,95 zł
Produkt	Produkt niedostępny
Czas wysyłki	24h
Numer katalogowy	5909990055944
Kod EAN	5909990055944
Producent	Us Pharmacia

Opis produktu

Wskazania:

Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.

Działanie:

Xenna wpływa na organizm tak, aby sam usunął zaparcia, poprzez pobudzenie perystaltyki jelita grubego. Jednocześnie w sposób naturalny reguluje wewnętrzne procesy organizmu.

Skład:

1 saszetka zawiera : Sennae folium 0,9 - 1,1 g co odpowiada 30 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B.

Stosowanie:

Stosować doustnie: 1 raz dziennie 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody (ok.200 ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 minut. Pić od pół szklanki naparu do całej szklanki naparu jednorazowo przed snem. Należy stosować najmniejszą dawkę Xenny powodującą uzyskanie miękkiego stolca i nie przekraczać zalecanej dawki (1 saszetka) w ciągu doby.

Przeciwwskazania:

- niedrożność jelit
- ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy,
- nadwrażliwość na sennozydy,
- niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej,
- stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów,
- miesiączka.

Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane:

Niekiedy mogą wystąpić bóle brzucha, biegunka i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie niedobór potasu (hipokalemia), nudności. Przewlekłe, niezgodne z zaleceniami stosowanie może powodować przebarwienie błony śluzowej okrężnicy (pseudomelanosis coli), białkomocz i krwiomocz oraz upośledzenie czynności motorycznej jelita grubego. Sennozydy mogą zmieniać barwę moczu.

Następstwem długotrwałego stosowania Xenny może być obniżenie stężenia potasu we krwi, a to z kolei może nasilać działanie glikozydów nasercowych oraz innych środków antyarytmicznych.

Uwagi:

Nie stosować przy silnych bólach brzucha, wymiotach lub zawrotach głowy. Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 7-10 dni ze względu na możliwość przyzwyczajenia i nasilenia zaparć. Lek można zastosować tylko wówczas, gdy zmiana diety, a następnie łagodne środki przeczyszczające nie dały pożądaných efektów.